

Anti-migraineux - Allaitement

Date de mise à jour : 27.10.2025

EN PRATIQUE

• TRAITEMENT DE LA CRISE

- L'une des molécules suivantes peut être utilisée pour traiter une crise de migraine en cours d'allaitement (cliquez sur les noms des substances) :
 - Parmi les antalgiques de palier 1 (ordre alphabétique) :
 - L'[aspirine](#) en prise unique
 - Le [diclofenac](#)
 - L'[ibuprofène](#)
 - Le [kétoprofène](#)
 - Le [paracétamol](#)
 - Parmi les triptans :
 - De préférence le [sumatriptan](#)
 - Si cette option ne convient pas, l'[élétriptan](#), le [rizatriptan](#), ou le [zolmitriptan](#).
 - Si un traitement de la nausée et/ou des vomissements est nécessaire, on peut utiliser la [dompéridone](#) ou le [métoclopramide](#).

• TRAITEMENT DE FOND

- Les traitements suivants peuvent être utilisés en traitement de fond de la migraine chez la femme qui allaite :
 - L'[amitriptyline](#)
 - Le [propranolol](#)
 - La [toxine botulinique](#).

Consulter aussi sur notre site

[Anti-migraineux - Grossesse](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.