

Pénicillines - Allaitement

Date de mise à jour : 31.07.2024

Les pénicillines sont des antibiotiques de la classe des bêta-lactamines.

ETAT DES CONNAISSANCES

- Des données publiées concernant le passage des pénicillines dans le lait sont disponibles pour la quasi-totalité des molécules :
 - Elles montrent que le passage des pénicillines dans le lait est très faible : l'enfant reçoit moins de 1 % de la dose pédiatrique de la molécule (en mg/kg).
- De manière générale, l'usage des bêta-lactamines en cours d'allaitement est très répandu et bien toléré :
 - D'exceptionnelles réactions allergiques ont été observées chez des enfants allaités dont la mère recevait une bêta-lactamine

EN PRATIQUE

L'ensemble des pénicillines pourra être utilisé pendant l'allaitement, quelle que soit la voie d'administration, sauf si l'enfant est allergique aux bêta-lactamines.

- **Voie orale**
 - [Pénicilline V](#)
 - [Pivmecillinam](#)
- **Voie injectable**
 - [Ampicilline](#), seule ou en association avec le [sulbactam](#) ([Unacim®](#))
 - [Oxacilline](#)
 - [Pénicilline G](#)
 - [Pipéracilline](#), seule ou en association avec le [tazobactam](#) ([Tazocilline®](#))
 - [Ticarcilline](#), seule ou en association avec l'[acide clavulanique](#) ([Claventin®](#), [Timentin®](#))
- **Voie orale ou injectable**
 - [Amoxicilline](#), seule ou en association avec l'[acide clavulanique](#) ([Augmentin®](#), [Levmentin®](#))
 - [Cloxacilline](#)

Consulter aussi sur notre site

[Pénicillines - Grossesse](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
