

Antihistaminiques H1 - Allaitement

Date de mise à jour : 26.07.2024

ETAT DES CONNAISSANCES

- Pour les antihistaminiques H1 suivants, la quantité ingérée via le lait est le plus souvent très faible et aucun événement particulier attribuable au traitement n'est rapporté chez des enfants allaités.
 - [Azélastine](#) (Allergodil®).
 - [Cétirizine](#) (Zyrtec®, Zyrtecset®).
 - [Desloratadine](#) (Aerius®).
 - [Fexofénadine](#) (Telfast®).
 - [Lévocétirizine](#) (Xyzall®).
 - [Loratadine](#) (Clarityne®).

EN PRATIQUE

- Au vu des données disponibles (cf. Etat des connaissances), dans le traitement de l'allergie, les antihistaminiques H1 (anti-H1) suivants sont utilisables en cours d'allaitement :
 - [Azélastine](#) (Allergodil®).
 - [Cétirizine](#) (Zyrtec®, Zyrtecset®).
 - [Desloratadine](#) (Aerius®).
 - [Fexofénadine](#) (Telfast®).
 - [Lévocétirizine](#) (Xyzall®).
 - [Loratadine](#) (Clarityne®).

Consulter aussi sur notre site

[Antihistaminiques H1 - Grossesse](#)
[Classification des antihistaminiques H1](#)
[Rhinite- Allaitement](#)
[Collyres antiallergiques -Allaitement](#)
[Corticoïdes - Allaitement](#)
[Désensibilisation - Allaitement](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.