

Acide clavulanique - Grossesse

Date de mise à jour : 31.07.2024

L'acide clavulanique est un inhibiteur des bêtalactamases.

Il ne s'utilise qu'en association soit avec l'[amoxicilline](#) ([Augmentin®](#), [Levmentin®](#)), soit avec la [ticarcilline](#) ([Claventin®](#) - [Timentin®](#)).

ETAT DES CONNAISSANCES

- Les données publiées chez les femmes enceintes exposées à l'acide clavulanique en cours de grossesse sont très nombreuses et aucun effet malformatif, foetal ou néonatal attribuable à l'acide clavulanique n'est [retenu](#) à ce jour.
- Les résultats d'une étude établissant un lien de causalité entre la prise de l'association acide clavulanique-amoxicilline avant l'accouchement et la survenue d'une entérocolite nécrosante (ECN) chez le nouveau-né ne peuvent être pris en compte pour plusieurs raisons :
 - L'absence de stratification sur le terme et le poids de naissance des enfants dans l'analyse des ECN.
 - Le rapport de dose amoxicilline/acide clavulanique différent de celui de la spécialité Augmentin® (2/1 au lieu de 8/1).
 - Ces résultats n'ont pas été confirmés par 3 autres études.

EN PRATIQUE

- Consulter les pages de chaque spécialité :
 - acide clavulanique + [amoxicilline](#) : [Augmentin®](#), [Levmentin®](#)
 - acide clavulanique + [ticarcilline](#) : [Claventin®](#) - [Timentin](#)

Consulter aussi sur notre site

[Acide clavulanique - Allaitement](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
