

Anxiolytiques – Grossesse et allaitement

Repères pharmacologiques

		DCI	Spécialité	Demi-vie (h)	Métabolites actifs	Puissance d'action
Benzodiazépines anxiolytiques	Durée d'action courte	alprazolam	Xanax®	10-20	-	haute
		clotiazépatam	Vératran®	4	+	intermédiaire
		lorazépatam	Temesta®	10-20	-	haute
		oxazépatam	Séresta®	8	-	faible
	Durée d'action intermédiaire	bromazépatam	Lexomil®	20	+	haute
	Durée d'action longue	chlordiazépatam	Librax®	6-30	+	faible
		clobazam	Likozam®, Urbanyl®	36-79	+	intermédiaire
		clorazépatam	Tranxène®	50-100	+	intermédiaire
		diazépatam	Valium®	30-150	+	intermédiaire
		loflazépatam	Victan®	77	-	intermédiaire
nordazépatam		Nordaz®	30-150	+	intermédiaire	
Autres anxiolytiques		buspirone	Buspar®	2-11	+	
		cyamémazine	Tercian®	10	+	
		étifoxine	Stresam®	20	+	
		hydroxyzine	Atarax®	20	+	

Copyright CRAT 2019 – Tous droits réservés 2019 – www.lecrat.fr