

Traitement des verrues - Allaitement

Date de mise à jour : 12.01.2024

-
- Les verrues peuvent être traitées par des moyens :
 - Physiques : cryothérapie, laser, curetage chirurgical.
 - Chimiques : traitement kératolytique local à base d'acide salicylique le plus souvent.
 - En cas de lésions étendues ou s'il y a un doute sur le diagnostic, le recours au dermatologue est nécessaire.
-

ETAT DES CONNAISSANCES

- Les méthodes physiques ne soulèvent pas d'inquiétude en cours d'allaitement car leurs effets sont localisés à la zone traitée.
- L'acide salicylique contenu dans les kératolytiques est en partie absorbé lors de l'application cutanée. Toutefois il y a tout lieu de considérer que si la surface traitée est faible, la quantité d'acide salicylique retrouvée dans la circulation systémique sera bien inférieure à celle retrouvée aux posologies journalières acceptables d'[aspirine](#) en cours d'allaitement, ce d'autant qu'il s'agit de verrues plantaires (couche cornée épaisse).

EN PRATIQUE

- Au vu des données disponibles sur les traitements des verrues (cf. Etat des connaissances), les moyens physiques et l'acide salicylique en application locale peuvent être utilisés pendant l'allaitement.

Consulter aussi sur notre site

[Traitement des verrues - Grossesse](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
