

Clonazépam - Allaitement

Date de mise à jour : 04.04.2025

RIVOTRIL®

Le clonazépam est une benzodiazépine utilisée dans le traitement de l'épilepsie.

Sa demi-vie d'élimination plasmatique est longue, en moyenne de l'ordre de 40 heures.

L'interruption brutale d'un traitement chronique par une benzodiazépine expose à un risque de sevrage.

ETAT DES CONNAISSANCES

- La quantité de clonazépam ingérée via le lait semble assez faible : la dose reçue par l'enfant représente au maximum 4% de la dose maternelle (en mg/kg).
- Dans la littérature, parmi une trentaine d'enfants allaités, quelques-uns ont présenté des effets indésirables (sédation, hypotonie, apnée) compatibles avec le profil pharmacologique du clonazépam.
- La demi-vie d'élimination plasmatique du clonazépam est longue : jusqu'à 60 heures. Ceci est un facteur de risque d'accumulation chez l'enfant allaité.

EN PRATIQUE

- Au vu des données disponibles sur le clonazépam et l'allaitement (cf. Etat des connaissances), il est préférable de **ne pas allaiter sous clonazépam**.
-

Consulter aussi sur notre site

[Clonazépam - Grossesse](#)

[Epilepsie - Grossesse](#)

[Antiépileptiques - Grossesse](#)

[Acide folique et prévention des malformations congénitales](#)

[Anxiolytiques - Allaitement](#)

[Antalgiques - Allaitement](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
