

Céphalosporines - Allaitement

Date de mise à jour : 31.07.2024

Les céphalosporines sont des antibiotiques de la classe des bêta-lactamines.

ETAT DES CONNAISSANCES

- De manière générale, le passage des bêta-lactamines dans le lait est très faible (moins de 1 % de la dose pédiatrique de la molécule, en mg/kg).
- L'usage des bêta-lactamines en cours d'allaitement est très répandu et bien toléré :
 - D'exceptionnelles réactions allergiques ont été observées chez des enfants allaités dont la mère recevait une bêta-lactamine.

EN PRATIQUE

- Au vu des données disponibles sur les céphalosporines et l'allaitement (cf. Etat des connaissances), un allaitement maternel est **possible** avec l'ensemble des céphalosporines suivantes, quelle que soit la voie d'administration, sauf si l'enfant est allergique aux bêta-lactamines.
 - **Céphalosporines de 1ère génération**
 - Voie orale :
 - [Céfaclor](#)
 - [Céfadroxil](#)
 - [Céfalexine](#)
 - [Cefradine](#)
 - Voie injectable :
 - [Céfazoline](#)
 - **Céphalosporines de 2ème génération**
 - Voie injectable :
 - [Céfoxitine](#)
 - [Céfuroxime](#)
 - **Céphalosporines de 3ème génération**
 - Voie orale :
 - [Céfotiam](#)
 - Voie injectable :
 - [Cefotaxime](#)
 - [Ceftazidime](#)
 - [Ceftriaxone](#)
- Un allaitement maternel est **envisageable** avec l'ensemble des céphalosporines suivantes, quelle que soit la voie d'administration, sauf si l'enfant est allergique aux bêta-lactamines.
 - **Céphalosporines de 2ème génération**
 - [Céfamandole](#)
 - **Céphalosporines de 3ème génération**
 - [Céfixime](#)
 - [Cefpodoxime](#)

- Céphalosporine de 4ème génération
 - [Céfépime](#)

Consulter aussi sur notre site

[Céphalosporines – Grossesse](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
