

Pristinamycine - Allaitement

Date de mise à jour : 31.07.2024

PYOSTACINE®

La pristinamycine est un antibiotique de la famille des streptogramines, classe apparentée aux macrolides. Elle est utilisée par voie orale, notamment en cas d'infection à staphylocoques.

ETAT DES CONNAISSANCES

- Il n'y a pas de donnée publiée sur la pristinamycine et l'allaitement.
- Toutefois, aucun événement particulier n'a été signalé à ce jour chez des enfants allaités de mères traitées par pristinamycine, et la pristinamycine est un antibiotique utilisé en pédiatrie.

EN PRATIQUE

- Au vu des éléments disponibles sur la pristinamycine (cf. Etat des connaissances), on préférera un antibiotique mieux évalué en cours d'allaitement : en fonction des indications, soit un autre macrolide (cf. [Macrolides et apparentés - Allaitement](#)), soit un autre anti-staphylococcique.
 - Si ces options ne conviennent pas, l'utilisation de la pristinamycine est envisageable chez une femme qui allaite, sauf si la durée du traitement est supérieure à 14 jours.
-

Consulter aussi sur notre site

[Pristinamycine - Grossesse](#)

[Macrolides et apparentés - Allaitement](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
