

Desobel® - Mercilon® - Varnoline® - Allaitement

Date de mise à jour : 16.02.21

DESOBEL® - MERCILON® - VARNOLINE®

Ce sont des contraceptifs oraux combinés minidosés.

Ils sont constitués :

- d'un estrogène : [éthinyloestradiol](#) (20 et 30 µg).
 - d'un progestatif : [désogestrel](#) (0,15 mg).
-

ETAT DES CONNAISSANCES

Consulter l'état des connaissances de chaque molécule:

- [éthinyloestradiol](#)
- [désogestrel](#)

EN PRATIQUE

- On utilisera de préférence un progestatif non associé à l'éthinyloestradiol (cf. [Contraception hormonale et allaitement](#)).
 - Au vu des données disponibles (cf. Etat des connaissances), l'utilisation d'une contraception estroprogestative à base de désogestrel n'est envisageable qu'à partir de 6 semaines après l'accouchement (cf. [Ethinyloestradiol - Allaitement](#)).
-

Consulter aussi sur notre site

[Desobel® - Mercilon® - Varnoline® - Grossesse](#)
[Contraception hormonale et allaitement](#)
[Ethinyloestradiol - Allaitement](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.