

Antiacnéiques - Allaitement

Date de mise à jour : 05.01.2024

EN PRATIQUE

- Les traitements suivants sont utilisables pendant l'allaitement (pour plus d'information, cliquez sur chaque molécule) :
 - **Voie cutanée :**
 - Le [peroxyde de benzoyle](#) (Curaspotaqua®, Cutacnyl®).
 - Les antibactériens locaux : la [clindamycine](#) (Zindacline®), l'[érythromycine](#) (Eryfluid®, Erythrogel®) et l'[acide azélaïque](#) (Finacea®, Skinoren®).
 - Les rétinoïdes locaux : l'[adapalène](#) (Différine®), l'[isotrétinoïne](#) par voie cutanée (Roaccutane® Gel) et la [trétinoïne](#) (Effederm®, Ketrel®, Retacnyl®).
 - **Voie orale :**
 - Le [zinc](#) (Effizinc®, Rubozinc®), en tenant compte des autres apports éventuels de zinc (suppléments « polyvitaminés et oligoéléments » notamment).
 - L'[azithromycine](#) (Azadose®, Zithromax®, Ordipha®) ou l'[érythromycine](#) par voie orale (Ery®, Erythrocine®).

Consulter aussi sur notre site

[Antiacnéiques - Grossesse](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.