

Labétalol - Allaitement

Date de mise à jour : 13.12.24

TRANDATE®

Le labétalol est un bêtabloquant utilisé par voie orale dans le traitement de l'hypertension artérielle, et par voie injectable dans le traitement des urgences hypertensives (dont certaines pré-éclampsies).

Il a également des propriétés alpha-bloquantes, en particulier au niveau vasculaire (diminution des résistances périphériques).

L'effet bêtabloquant persiste après l'élimination plasmatique du médicament.

Les effets indésirables des bêtabloquants sont notamment une hypoglycémie, une bradycardie et une hypotension.

ETAT DES CONNAISSANCES

- La quantité de labétalol ingérée via le lait est très faible : l'enfant reçoit moins de 1% de la dose maternelle (en mg/kg) (calcul effectué sur une trentaine de patiente).
- Aucun événement particulier n'est [retenu](#) à ce jour chez les enfants allaités.

EN PRATIQUE

- Au vu des données disponibles sur le labétalol et l'allaitement (cf. Etat des connaissances), son utilisation est possible en cours d'allaitement, y compris en association avec d'autres traitements compatibles avec l'allaitement (comme par exemple la [nicardipine](#)).
-

Consulter aussi sur notre site

[Labétalol - Grossesse](#)

[Bêtabloquants - Allaitement](#)

[Antihypertenseurs - Allaitement](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
