

Alimémazine - Grossesse

Date de mise à jour : 13.07.21

THÉRALÈNE®

L'alimémazine est une phénothiazine utilisée dans l'[insomnie](#).
Ses effets indésirables sont notamment de type atropinique.

ETAT DES CONNAISSANCES

- **Aspect malformatif**
 - Les données publiées chez les femmes enceintes exposées à l'alimémazine au 1er trimestre de la grossesse sont peu nombreuses, mais aucun élément inquiétant n'est retenu à ce jour.
 - Il n'est pas tératogène chez l'animal.
- **Aspect foetal et néonatal**
 - Il n'y a pas de donnée publiée concernant des effets néonataux éventuels lors d'expositions à l'alimémazine en fin de grossesse.
 - Cependant, chez les nouveau-nés de mères traitées par d'autres phénothiazines jusqu'à l'accouchement, en particulier à fortes doses, des symptômes transitoires de type extrapyramidal et/ou atropinique peuvent parfois apparaître dans les premiers jours de vie. Il s'agit principalement d'une hypertonie, de trémulations, de détresse respiratoire et d'un ralentissement du transit. Par ailleurs, en théorie, un effet sédatif pourrait survenir chez les nouveau-nés de mères traitées par de l'alimémazine avant l'accouchement.

EN PRATIQUE

- **Découverte d'une grossesse pendant le traitement**
 - [Rassurer](#) la patiente quant au risque malformatif de l'alimémazine.
 - Si un traitement doit être maintenu, on préférera un autre hypnotique mieux connu en cours de grossesse. (cf. [Hypnotiques - Grossesse](#)).
- **Traiter une femme enceinte**
 - Si un traitement est nécessaire, on préférera un autre hypnotique mieux connu en cours de grossesse. (cf. [Hypnotiques - Grossesse](#)).

Consulter aussi sur notre site

[Alimémazine - Allaitement](#)

[Antihistaminiques H1 - Grossesse](#)

[Hypnotiques - Grossesse](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.



CRAT