

Bambutérol - Grossesse

Date de mise à jour : 28.08.2025

OXEOL®

Le bambutérol est un bêta-2 mimétique d'action prolongée, précurseur de la [terbutaline](#).

Il est utilisé essentiellement dans l'asthme.

Il n'existe que par voie orale.

Par voie générale (orale ou injectable), les bêta-2 mimétiques peuvent entraîner des effets indésirables, notamment des céphalées, des tremblements, des palpitations et des tachycardies.

ETAT DES CONNAISSANCES

- **Aspect malformatif**

- Le bambutérol est la prodigue de la [terbutaline](#) pour laquelle les données publiées chez les femmes enceintes exposées au 1er trimestre de la grossesse sont très nombreuses et aucun effet malformatif attribuable à ce médicament n'est [retenu](#) à ce jour.

- **Aspect fœtal et néonatal**

- Les bêta-2 mimétiques peuvent entraîner, en particulier à fortes doses, une tachycardie fœtale et/ou néonatale parallèle à la tachycardie maternelle, ainsi que des perturbations de la glycémie néonatale en cas d'exposition avant l'accouchement. Ces effets sont transitoires.

EN PRATIQUE

Chez la femme enceinte, l'asthme doit être traité aussi efficacement qu'en dehors de la grossesse. En effet, un asthme mal équilibré peut avoir un effet délétère sur la grossesse/le nouveau-né (prématurité, petit poids de naissance...). Penser à vacciner une femme enceinte asthmatique contre la grippe saisonnière lorsque la grossesse couvre tout ou partie de la période d'épidémie.

- **En prévision d'une grossesse / En préconceptionnel**

- Une [consultation préconceptionnelle](#) est souhaitable, afin de s'assurer du bon équilibre thérapeutique de l'asthme avant la grossesse.
- On préférera un bêta-2 mimétique d'action prolongée **inhale**, en raison du passage systémique moindre par cette voie d'administration : [formotérol](#) ou [salmétérol](#).

- **Découverte d'une grossesse pendant le traitement**

- [Rassurer](#) la patiente quant au risque malformatif du bambutérol.
- Si un traitement doit être poursuivi, voir ci-dessous "Traiter une femme enceinte".

- **Traiter une femme enceinte**

- On préférera un bêta-2 mimétique d'action prolongée **inhale** en raison du passage systémique moindre par cette voie d'administration : [formotérol](#) ou [salmétérol](#).
-

Consulter aussi sur notre site

[Bambutérol - Allaitement](#)

[Antiasthmatiques - Grossesse](#)

Pour en savoir plus

[Prise en charge de l'asthme : recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française \(SPLF\).](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.

CRAT