

Bambutérol - Allaitement

Date de mise à jour : 11.09.2025

OXEOL®

Le bambutérol est un bêta-2 mimétique d'action prolongée, précurseur de la [terbutaline](#).

Il est utilisé essentiellement dans l'asthme.

Il n'existe que par voie orale.

Par voie générale (orale ou injectable), les bêta-2 mimétiques peuvent entraîner des effets indésirables, notamment des céphalées, des tremblements, des palpitations et des tachycardies.

ETAT DES CONNAISSANCES

- Le bambutérol est métabolisé en terbutaline.
- Il n'y a pas de donnée publiée sur le bambutérol et l'allaitement, mais aucun événement particulier n'a été signalé à ce jour chez des enfants allaités de mères sous terbutaline ou bambutérol.
- La quantité de terbutaline ingérée via le lait est très faible : l'enfant reçoit moins de 1% de la dose maternelle (en mg/kg) prise par voie orale (calcul effectué sur les dosages réalisés chez huit patientes).
- Les concentrations plasmatiques de terbutaline sont indétectables chez un enfant allaité de mère traitée par voie orale.

EN PRATIQUE

- Au vu des éléments disponibles sur le bambutérol (cf. Etat des connaissances), son utilisation est possible chez une femme qui allaite.
-

Consulter aussi sur notre site

[Bambutérol - Grossesse](#)

[Antiasthmatiques - Allaitement](#)

Pour en savoir plus

[Prise en charge de l'asthme : recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française \(SPLF\)](#).

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
