

Lidocaïne - Allaitement

Date de mise à jour : 16.05.2024

DYNEXAN® - GLYDO® - INSTILLAGEL® - LIDBREE® - MESOCAINE® - OPHTESIC® - RYLIGENCY® - VERSATIS® - XYLOCAINE® - XYLOCARD® - XYLOCONTACT® - XYLONOR® - XYLOROLLAND®

La lidocaïne est un anesthésique local.

Elle est également utilisée en IV dans les troubles du rythme ventriculaire menaçant le pronostic vital.

Lors de son utilisation par voie locale, les concentrations plasmatiques de lidocaïne sont généralement faibles.

ETAT DES CONNAISSANCES

- Le passage systémique de la lidocaïne utilisée par voie locale est faible.

EN PRATIQUE

- Au vu des éléments disponibles sur la lidocaïne (cf. Etat des connaissances), son utilisation par voie locale est possible chez une femme qui allaite.
-

Consulter aussi sur notre site

[Lidocaïne - Grossesse](#)

[Antihémorroïdaires - Allaitement](#)

[Anesthésie dentaire - Allaitement](#)

[Association lidocaïne + prilocaïne - Allaitement](#)

[AINS - Allaitement](#)

[Antalgiques - Allaitement](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
