

Ethambutol - Grossesse

Date de mise à jour : 02.06.2025

DEXAMBUTOL® - MYAMBUTOL®

L'éthambutol est un antibiotique utilisé par voie orale ou injectable dans la tuberculose et les infections à mycobactéries atypiques sensibles.

Ses effets indésirables sont notamment des troubles oculaires à type de névrite optique.

ETAT DES CONNAISSANCES

- Les données publiées chez les femmes enceintes exposées à l'éthambutol en cours de grossesse sont peu nombreuses mais le recul d'utilisation est très important et aucun effet malformatif, fœtal ou néonatal attribuable au traitement n'est [retenu](#) à ce jour.

EN PRATIQUE

Chez la femme enceinte, le traitement de la tuberculose doit être identique au schéma thérapeutique hors grossesse.

- **En prévision d'une grossesse / En préconceptionnel**
 - Une [consultation préconceptionnelle](#) est souhaitable afin de faire le point sur la pathologie et son traitement en vue d'une future grossesse.
 - L'éthambutol peut être poursuivi dans la perspective d'une grossesse.
- **Découverte d'une grossesse pendant le traitement**
 - [Rassurer](#) la patiente quant au risque malformatif de l'éthambutol.
 - Pour la poursuite du traitement, voir ci-dessous « Traiter une femme enceinte ».
- **Traiter une femme enceinte**
 - Il est possible d'utiliser l'éthambutol quel que soit le terme de la grossesse selon le schéma thérapeutique prévu.

Consulter aussi sur notre site

[Ethambutol – Allaitement](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
