

Nimodipine - Allaitement

Date de mise à jour : 14.11.2025

NIMOTOP®

La nimodipine est un inhibiteur calcique de la classe des dihydropyridines.

Elle est utilisée par voie IV ou orale dans le traitement et la prévention des déficits neurologiques ischémiques consécutifs à une hémorragie sous-arachnoïdienne d'origine anévrysmale et par voie orale dans leur prévention.

ETAT DES CONNAISSANCES

- La quantité de nimodipine ingérée via le lait est très faible : l'enfant reçoit moins de 1% de la dose maternelle (en mg/kg) (calculs effectués sur les dosages réalisés chez deux femmes).
- Il n'y a pas de donnée sur des enfants allaités par des mères traitées par nimodipine.
- La biodisponibilité orale de la nimodipine est faible (environ 13%), et sa demi-vie d'élimination plasmatique est courte, de 1,1 à 1,7 heures.

EN PRATIQUE

- Au vu des éléments disponibles sur la nimodipine et l'allaitement (cf. Etat des connaissances):
 - **Voie IV** : en raison du bénéfice attendu, son utilisation est possible chez une femme qui allaite. On proposera d'attendre 3 heures après la fin de la perfusion (environ 2 demi-vies) avant de remettre l'enfant au sein.
 - **Voie orale** : si le recours à la nimodipine est nécessaire, son utilisation est envisageable en cours d'allaitement si l'enfant est bien portant et sous réserve d'une surveillance cardio-tensionnelle de l'enfant allaité pendant les premiers jours du traitement.

Consulter aussi sur notre site

[Nimodipine- Grossesse](#)

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
