

Dose à l'utérus des principaux examens courants de radiodiagnostic

Date de mise à jour : 01.04.2025

Irradiation délivrée à l'utérus lors des principaux examens de radiodiagnostic.
D'après les données de l'[IRSN/ASNR](#) et la [publication 84 de la CIPR](#).

ETAT DES CONNAISSANCES

Utérus dans le faisceau des radiations (données de l'IRSN)

Radiologie conventionnelle	Intervalles de dose utérine (mGy)
Abdomen	[0,5 - 2]
Pelvis	[0,5 - 3,5]
Rachis lombaire	[1,5 - 7]
Urographie veineuse	[1,5 - 3]
Lavement baryté	[6 - 8]
Bassin+rachis lombo-sacré	[9 -10]

Scanner	intervalles de dose utérine (mGy)
Abdomen + Pelvis	[5 - 36]
Rachis lombaire	[20 - 40]

Utérus en dehors du faisceau des radiations (données de la CIPR)

Examens radiographiques classiques	Dose utérine Moyenne (mGy)	Dose utérine Maximale (mGy)
Thorax	<0,01	<0,01
Crâne	<0,01	<0,01
Rachis dorsal	<0,01	<0,01

Examen radioscopiques	Dose utérine Moyenne (mGy)	Dose utérine Maximale (mGy)
Transit baryté (TOGD)	1,1	5,8

Scanner	Dose utérine Moyenne (mGy)	Dose utérine Maximale (mGy)
Thorax	0,06	0,96
Tête	<0,005	<0,005

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.
